





FICHE DESCRIPTIVE LES CORVIDES

	Corbeau freux <i>(Corvus frugilegus)</i>	Corneille noire <i>(Corvus corone)</i>	Choucas des tours <i>(Corvus monedula)</i>
	 <p>Source photo Internet</p>	 <p>Source photo Internet</p>	 <p>Source photo Internet</p>
Caractéristiques morphologiques et distinctives	<p>Taille : 41 à 49 cm Envergure : 81 à 94 cm Plumage : noir à reflets métalliques violets. La base du bec est dépourvue de plumes, blanchâtre.</p>	<p>Taille : 44 à 51 cm Envergure : 84 à 100 cm Plumage : noir à reflets métalliques verts/bleus Bec de couleur noire.</p>	<p>Taille : 30 à 34 cm Envergure : 64 à 73 cm Plumage : noir, nuque et joue grises L'œil est argenté, la nuque grise.</p>
Habitat	Campagnes cultivées avec bosquets, plantations de peupliers mais aussi parcs, champs, prairies et grands arbres dans les agglomérations.	Bosquets d'arbres dispersés, champs, prairies, cultures, parcs.	Falaises, carrières, clochers, tours, ruines, châteaux, allées de grands arbres. Espèce très présente dans les villes.
Régime alimentaire	Omnivore, mais se nourrit essentiellement d'insectes, vers de terre, larves, mollusques, graines, végétaux.	Omnivore (insectes, larves, mollusques, œufs, oisillons, charognes, petits vertébrés, graines, fruits)	Omnivore (insectes, vers, mollusques, œufs, oisillons, petits vertébrés, graines, fruits)
Reproduction	Niche en colonies. Le nid est construit assez haut dans les arbres à l'aide de branchages et de brindilles. La femelle pond 3 à 5 œufs au mois de mars.	Le couple niche à l'écart de ses congénères. Le nid est construit assez haut dans un arbre, à l'aide de branchages, de brindilles et de terre. La ponte a lieu d'avril à mai. La femelle pond 3 à 5 œufs.	Le nid est construit dans une cheminée, un trou d'arbre, un mur, une cavité rocheuse. La période de nidification se déroule entre avril et juin. La femelle pond de 3 à 7 œufs.
Comportement	Espèce grégaire, certains groupes peuvent atteindre plusieurs centaines d'individus.	Espèce beaucoup moins grégaire que le corbeau freux, se déplace en plus petits groupes.	Espèce grégaire. On le retrouve souvent en compagnie des corbeaux freux et des corneilles noires.
Nuisances et dégâts	Dégâts sur cultures (consommation de graines et de jeunes plants).	Dégâts sur cultures (consommation de graines et de jeunes plants). Dégâts sur les bâches agricoles. Prédation sur la faune sauvage (œufs, juvéniles) et les élevages.	Dégâts sur cultures (consommation de graines et de jeunes plants.) Les nids obstruent les conduits de cheminées et peuvent provoquer des incendies.
Statuts	Espèce classée « susceptible d'occasionner des dégâts »	Espèce classée « susceptible d'occasionner des dégâts »	 Espèce protégée (à relâcher en cas de capture)